


B형 간염과 건강한 아기





B형 간염이란?

B형 간염은 세계 여러 나라에서 빈번하게 발병하는 심각한 질병입니다. 전세계에서 수백 만 명의 사람들이 B형 간염을 앓고 있습니다. B형 간염 환자들 중 많은 사람들은 증상을 느끼지 못합니다. 일부는 자각 증상을 느끼기도 합니다.



본 자료는 B형 간염 보균자이면서 임신 중이거나 갓 출산한 여성을 대상으로 합니다. B형 간염은 신생아에게 치명적일 수 있습니다. 이 자료는 B형 간염에 대한 정보와 본인 자신과 아기를 건강하게 지키는 방법을 설명해드립니다.



B형 간염 보균 사실을 어떻게 알 수 있는가?

임산부가 의사의 진료를 받을 때 B형 간염에 대한 검사를 실시합니다. 임신 상태에서 의사의 진료를 받지 않은 여성은 출산 시에 병원에서 검사를 받게 됩니다. 간호사는 이 검사를 위해 여성의 팔에서 소량의 혈액을 채취합니다.



아기는 어떻게 **B**형 간염에 걸리는가?

B형 간염 보균 여성은 출산하는 동안 신생아에게 전염시킬 수 있습니다. 만약, 아기가 **B**형 간염에 감염될 시 아기는 성장하면서 큰 질병을 앓을 수 있습니다.



의사들이 아기가 **B형** 간염에 걸리지 않도록 할 수 있나요?

예, 할 수 있습니다. 미국에서 태어난 모든 신생아에게는 B형 간염 예방 접종을 실시합니다. 첫 번째 접종은 분만 직후에 병원에서 실시됩니다.



B형 간염을 예방하려면 아기에게 몇 회의 접종을 실시해야 하는가?

아기는 B형 간염 예방을 위해 3회 이상의 접종을 받습니다. 담당 의사가 B형 간염 예방을 위해 몇 회의 접종을 실시할 것인지 이야기할 것입니다. 또한 검사와 다른 접종을 위해 아기를 데리고 병원을 방문할 것을 요청할 것입니다. 이를 통해 아기의 건강을 지킬 수 있습니다.



아기는 언제 의사에게 데려와야 하는가?

담당 의사나 간호사가 언제 아기를 병원에 데려와야 할 지를 알려주며, 아기가 1달 또는 2달이 되면 두 번째 B형 간염 예방 접종을 받아야 합니다. 두 번째 접종을 위해 아기를 병원에 데리고 가는 것은 매우 중요합니다. 두 번째 접종 후에는 B형 간염 예방을 위한 세 번째 접종이 필요합니다. 의사가 세 번째 접종 시기를 알려주고, 아기에게 추가 접종이 필요한지 여부도 설명할 것입니다.



아기에게 모유를 먹일 수 있는가?

예, 모유를 먹일 수 있습니다. B형 간염은 모유를 통해 전염되지 않습니다.



가족과 함께 식사를 할 수 있는가?

예, 그렇게 할 수 있습니다. B형 간염은 같은 식탁에서 식사를 하거나 식기를 공유하는 것으로는 전염되지 않습니다. 어떤 엄마들은 음식을 씹어 아기에게 먹이는 경우가 있는데, 의사들은 이러한 행동을 금지시키고 있습니다. 아기는 엄마가 씹은 음식으로부터 B형 간염에 걸릴 수 있습니다.



아기를 껴안고 입맞춤하는 것은 안전한가?

예, 아기를 껴안고 입맞춤하는 것은 안전합니다. 껴안거나 입맞춤을 통해 B형 간염은 전염되지 않습니다.



가족의 건강을 지키기 위해 어떻게 해야 하는가?

한 집에 살고 있는 모든 사람은 의사의 진료를 받아야 합니다. 다시 말하면, 아이들을 포함하여 집에 같이 살고 있는 모든 가족이 의사와 상담해야 합니다. 아이의 아버지도 의사의 진료를 받아야 합니다. 의사가 B형 간염 예방법에 대해 가족에게 설명해 줄 것입니다.



궁금한 점이 있으십니까? 질문이 있는 경우를 대비하여 통역이 가능한 사람을 찾아보겠습니다.